



1987-2017
30 años ENSE

ENSE Encuesta Nacional de Salud España 2017

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Madrid, 26 junio 2018

ENSE Encuesta Nacional de Salud España 2017

Resumen metodológico


- ∞ Convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística
- ∞ Encuesta a gran escala mediante entrevista personal domiciliaria (CAPI)
- ∞ Estadísticamente representativa de la población no institucionalizada residente en España
- ∞ **Ámbito**
 - Poblacional - personas residentes en viviendas familiares
 - Temporal - octubre 2016 a octubre 2017
 - Territorial - nacional
- ∞ **Muestra**
 - 29.195 individuos
 - adultos (15+ años) = 23.089 entrevistas personales
 - menores (0 -14 años) = 6.106 entrevistas indirectas (padre, madre o tutor)
 - Muestreo probabilístico trietápico estratificado
- ∞ Representatividad nacional y autonómica
- ∞ Tasa de respuesta 72,2% (hogares encuestados/ encuestables)



ENSE Encuesta Nacional de Salud España 2017


1

Estado de salud




2

Uso de servicios sanitarios



3


Determinantes de salud



Tendencias y desigualdades

Percepción positiva del estado de salud 1987-2017

Población de 0 y más años



GOBIERNO DE ESPAÑA










MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

Encuesta Nacional de Salud España 2017




Percepción positiva del estado de salud 1987-2017

Población por grupo de edad



Percepción positiva del estado de salud


Población de 0 y más años





Percepción positiva del estado de salud y clase social


Población de 0 y más años



En la clase más alta, el 85% percibe su salud como buena o muy buena, frente al 67% en la clase más baja. El gradiente es más acentuado en mujeres.


Trastornos crónicos prevalentes en adultos

Población de 15 y más años



Diabetes, hipertensión y colesterol 1993-2017


Población de 15 y más años






Trastornos crónicos prevalentes en población infantil

Población de 0-14 años



Limitaciones sensoriales, cognitivas y de movilidad

Población 65 y más años



La limitación de la movilidad afecta al 45%, las dificultades auditivas al 44%, cognitivas al 31% y visuales al 25%.




Deterioro cognitivo

Población de 45 y más años

Dificultad para recordar o para concentrarse


■ no puede hacerlo ■ mucha ■ alguna ■ ninguna



23% de las mujeres y 16% de los hombres (45+ años) tienen dificultad para recordar o para concentrarse.

Deterioro cognitivo y clase social


Población de 45 y más años



Autonomía para las actividades de la vida diaria


Población de 65 y más años

8/10 no tienen dificultad alguna para el cuidado personal (87% de los hombres y 76% de las mujeres) y 1/2 puede realizar las tareas del hogar sin ayuda




Dolor físico

Últimas 4 semanas. Población de 15 y más años








Uso servicios sanitarios 1987-2017

Últimos 12 meses. Población de 15 y más años




Uso de servicios sanitarios

Últimos 12 meses. Población de 0 y más años




Consulta dentista

Últimos 12 meses. Población de 0 y más años




Aumenta la población que acude al dentista, 50% en el último año, 53% de las mujeres y 48% de los hombres.





Vacunación antigripal


Últimos 12 meses. Población de 65 y más años






Programas de detección precoz de cáncer

Evolución de la cobertura 2009-2017



Cobertura sanitaria pública y privada 1993-2017


Población 0 y más años






Inaccessibilidad percibida a distintos tipos de atención sanitaria

Últimos 12 meses. Población de 15 y más años



Obesidad y sobrepeso adultos 1987-2017

Población de 18 y más años



Encuesta Nacional de Salud España 2017




GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL


Obesidad y sobrepeso en adultos por clase social

Población 18 y más años



Obesidad y sobrepeso infantil 1987-2017


Población 2 a 17 años



La obesidad infantil se mantiene en cifras elevadas y afecta más a las clases menos acomodadas

Sedentarismo en tiempo de ocio



Población de 5 y más años





Nivel de actividad física


Cuestionario Internacional de Actividad Física. Población de 15 a 69 años





Tiempo libre frente a la pantalla*


Población de 1 a 14 años



*horas al día entresemana

Lactancia materna exclusiva 1995-2017

Población de 6 meses a 4 años



Encuesta Nacional de Salud España 2017



GOBIERNO DE ESPAÑA


MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL



Consumo diario de fruta y verdura por clase social

Población de 1 y más años

El 64% come fruta fresca a diario, y el 45% verduras, ensaladas u hortalizas.






Consumo diario de refrescos azucarados por clase social

Población de 1 y más años



Consumo diario de tabaco 1993-2017

Población de 15 y más años*



Encuesta Nacional de Salud España 2017




GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

Consumo diario de tabaco 1993-2017

Población de 15 a 24 años*




*de 16 a 24 desde 1993 a 2009

Encuesta Nacional de Salud España 2017

Consumo diario de tabaco


Población de 15 y más años






Frecuencia de consumo de alcohol

Población de 15 y más años



Consumo habitual* de alcohol 2006-2017

Población de 15 y más años**



*consumo habitual = al menos un día a la semana

**16+ en 2006 y en 2009



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

Encuesta Nacional de Salud España 2017

Consumo intensivo episódico de alcohol

Población de 15 y más años

El 8% de la población de 15+ años ha consumido alcohol de manera intensiva en el último mes, 12% de los hombres y 4% de las mujeres

